

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
Департамента лекарственного
обеспечения и медицинской техники
Министерства здравоохранения
Кыргызской Республики
Дуйшеналиев Н.К. _____
« 03 » _____ ноября _____ 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ (PECTOLVAN HEDERA HELIX)

Торговое название
ПЕКТОЛВАН ПЛЮЩ
(PECTOLVAN HEDERA HELIX)

Международное непатентованное название
Нет

Состав

1 мл сиропа содержит

Действующее вещество: плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (*Hederae heliсis e folium*) 7 мг ((4-8:1)), (экстрагент – этанол 30 %);

Вспомогательные вещества: натрия цитрат; кислота лимонная, моногидрат; сорбит (Е 420); калия сорбат; ксантановая камедь; ароматизатор пищевой «Вишня 667» (растворитель пропиленгликоль); вода очищенная.

2,5 мл сиропа содержат 963 мг сахарозаменительного вещества сорбита = 0,08 хлебных единиц.

Лекарственная форма

Сироп.

Описание

Прозрачная жидкость светло-коричневого цвета с запахом вишни и сладким фруктовым вкусом, возможно появление легкой опалесценции.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяющиеся при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A.

Фармакологические свойства

Препарат растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действия, обусловленные присутствующими в нем гликозидами (сапонинами). Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

Показания к применению

Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем;

симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

Способ применения и дозы.

Применять внутрь с помощью прилагаемой дозирующей ложки.

Детям от 1 до 6 лет – по 2,5 мл 3 раза в сутки.

Детям с 6 до 10 лет – по 5 мл 3 раза в сутки.

Взрослым и детям с 10 лет – по 5-7,5 мл 3 раза в сутки.

Сироп следует применять утром, днем и вечером. Перед каждым применением необходимо тщательно взбалтывать флакон!

Длительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Для достижения стойкого терапевтического эффекта рекомендуется продолжить терапию еще 2-3 суток после улучшения состояния пациента.

Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата или другим растениям семейства Аралиевых. Детский возраст до 1 года в из-за риска ухудшения дыхательных симптомов. Непереносимость фруктозы.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, но иногда могут развиваться желудочно-кишечные расстройства (включая диарею, тошноту, рвоту), боль в животе, аллергические реакции (ангионевротический отек, высыпания на коже, крапивница, зуд), одышка, купероз, диспноэ.

При возникновении любых побочных реакций необходимо отменить лечение и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

При одновременном применении препарата Пектолван плющ и других лекарственных средств побочного действия не наблюдалось. Поэтому препарат можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например с антибиотиками.

Особые указания

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, повышение температуры тела, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Применение у детей 1-4 лет требует рекомендации врача.

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например, кодеин или декстрометорфан.

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

Применение в период беременности или кормления грудью.

В связи с отсутствием достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.

Дети.

Противопоказан детям до 1 года из-за риска ухудшения дыхательных симптомов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автомобилем или другими механизмами.

Не влияет.

Передозировка

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение. Лечение симптоматическое.

Срок годности

2 года.

Срок годности после вскрытия флакона – 90 суток.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 100 мл во флаконы стеклянные с винтовым горлом из коричневого стекла, укупоренные крышками винтовыми с кольцом контроля вскрытия. По 1 флакону вместе с дозирующей ложкой и инструкцией по медицинскому применению в пачке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

ПАО «Фармак»

Местонахождение производителя

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.